

ノミ成虫駆除剤

チャップスター[®] 錠 11.4 mg

(有効成分 ニテンピラム)



素早い
効果



高い
安全性

必要な分
だけ


経口で
ノミ成虫
駆除効果



即効性

Immediate effect

30分で効果が現れます。



キャプスター錠11.4mgは、投与後すばやく腸管より体内で吸収され猫で38分、犬で73分で最高血中濃度に達します。ペットに寄生したノミは15分に1回は吸血するので、全てのノミが薬剤を取り込みます。半減期は猫で7.5時間、犬では2.8時間で、主に腎臓を介して体外に速やかに排泄されます。

安全性

Safety

● 1日投与量(錠剤単位)の5倍量を、1日1回6週間の連続投与試験でも異常は認められませんでした。

犬および猫で、キャプスター錠11.4mgを1日投与量(錠剤単位)の5倍量、1日1回6週間の連続投与試験を実施しました。その結果、すべての動物において本剤投与に関連する副作用所見は認められませんでした。

試験終了後の剖検においても、臓器重量、肉眼的、組織学的に所見のいずれにおいても異常は認められませんでした。

● 仔猫・仔犬に使えます。

ただし、4週齢以下・1kg以下の猫・犬には使えません。

● 妊娠中・授乳中の猫・犬に使えます。

妊娠猫・および妊娠犬をもちい、妊娠期間・授乳期間にキャプスター錠を毎日投与し、その影響を調べました。その結果、妊娠動物およびその仔に毒性作用は認められず、仔の数、その後の成長等も対照(プラセボ投与)と比較して、統計的有意差は認められませんでした。